



CÁNCER GÁSTRICO



MANUELFIGUEROA.GI@UCHILE.CL



+56229788335

DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA HCUCH



WWW.CIRUGIADOCENTE.COM



@CIRUGIADOCENTE

EL ÓRGANO


El estómago es una víscera hueca en el abdomen que digiere alimentos, posee ganglios linfáticos a su alrededor.

EL PROBLEMA

Es una enfermedad neoplásica (cancerosa), en la cual la mucosa del estómago (la capa mas interna) presenta una lesión superficial o ulcerada en que las células se multiplican descontroladamente y pueden generar metástasis en ganglios y otros órganos.

TRATAMIENTO

Multidisciplinario con cirujano, oncólogo médico, patólogo y radioterapeuta (comité oncológico). En casos incipientes el tratamiento puede ser endoscópico o más frecuentemente quirúrgico y en casos avanzados se requiere quimioterapia antes de la cirugía y cirugía posteriormente para sacar parte o la totalidad del estómago y los ganglios que lo acompañan.



GES

Es GES a cualquier edad, garantía n° 27

SÍNTOMAS

- Sin síntomas o con dolor abdominal de más de 2 semanas de evolución
- Anemia
- Dificultad para el avance de la comida (sentir que se queda atorado en el tórax)
- Sensación de llene precoz al comer (saciedad prontamente al comer)
- Baja de peso y pérdida de apetito

DIAGNÓSTICO

EXÁMENES GENERALES

De sangre, orina y electrocardiograma

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

Nos permite ver la mucosa (el recubrimiento interno) del estómago y tomar biopsias.

SCANNER DE TORAX ABDOMEN Y PELVIS CON CONTRASTE ENDOVENOSO

Nos permite saber si el tumor está en el estómago o ha tenido metástasis a los ganglios u otros órganos.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO

- Cirugía en pabellón con anestesia general
- Tratamiento mínimamente invasivo o cirugía abierta, que consiste en extirpar parte o la totalidad del estómago, los ganglios y reconstituir el tránsito intestinal.
- 4 a 6 hr aprox. de cirugía
- 6 a 7 día de hospitalización aprox
- Licencia médica de 30 días

RIESGOS

- Complicaciones post operatorias entre 30 a 40%
 - Sangrado, infecciones, filtraciones de las suturas u obstrucciones intestinales.
- Mortalidad quirúrgica (morirse en los próximos 90 días a la cirugía) de 1 a 2%

PARA MÁS INFORMACIÓN Y REFERENCIAS ESCANEA LOS SIGUIENTES CÓDIGOS QR CON TU CELULAR

